

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

47M - 13 juin 1991

GRANDES CULTURES SEMENCES - N° 6

MAÏS (Gard - Hérault)

PUCERONS : Populations très importantes (quasi généralisées) sur toutes les cultures de la région

CICADELLES : Forte présence, mais plus localisée

SESAMIE : Poursuite timide du 1er vol mais le plus gros est à venir dans les 10 jours

PYRALES : Début du 1er vol, très intense sectoriellement

SITUATION

STADES

Le stade moyen des cultures est à 4-6 F, les plus avancées se situant à 6-8 F, mais les semis les plus tardifs n'ont, parfois, toujours pas levés et risquent d'être particulièrement exposés aux attaques des ravageurs.

PUCERONS

Plusieurs espèces sont présentes, principalement le *Metopolophium dirrhodum* (ligne dorsale d'un vert plus foncé que le reste du corps) et le *Rhopalosiphum padi* (corps globuleux, partie postérieure de l'abdomen rougeâtre) dont les seuils de nuisibilité sont souvent largement dépassés (50 pucerons/plante pour le premier et 1 plante/deux colonisée pour le second).

D'autre part avec la maturation des céréales à paille, les "cultures vertes" vont devenir des cibles privilégiées pour les pucerons, par contre la prédation naturelle (coccinelles, syrphes, chrysopes ...) a pris beaucoup de retard, même si l'on peut espérer son transfert rapide à partir des plantes en fin de cycle.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42



SESAMIE

Les captures au piège sexuel à femelles vierges demeurent encore faibles (Clairac, Lunel), mais l'essentiel du vol risque de se situer dans la quinzaine à venir. A ce jour pas de dégâts constatés sur les parcelles du réseau.

PYRALE

Les premières captures ont été très fortes à Caissargues (plaine de Nîmes) et Fourques (plaine d'Arles).

PRECONISATION

- **Observer** vos cultures pour évaluer les niveaux de pucerons, les éventuelles attaques de cicadelles (décolorations par petites tâches blanchâtres qui peuvent se rejoindre) ou de sésamie (perforation, dessèchement des tiges)
- **Suivant votre situation** (population de pucerons - secteur sensible à la sésamie ou non) choisir entre :
 - 1/ un aphicide spécifique "doux" pour les prédateurs contenant pirimicarbe, phosalone
 - 2/ un "anti-sésamie" spécifique, genre DIMILIN
 - 3/ un produit polyvalent à base de pyréthriinoïdes, appliqué en 2 fois à la demi dose "sésamie", à 10-12 jours d'intervalle.

Le KARATE K associant pirimicarbe et un pyréthriinoïde répond tout à fait à cette attente.

CONSULTEZ LE DEPLIANT PROTECTION DU MAÏS joint
avec le bulletin "Grandes Cultures Semences n° 2".

PHOMOPSIS/TOURNESOL (Aude)

Toujours pas de projections d'ascospores observées à ce jour.